



Délgazda Mezőgazdasági Szaküzlet Szaktanácsai

Kártevők és betegségek előrejelzése – Kistelek és Térsége

Időszak: június hó

Gyümölcs – Szőlő – Kiskert

Hibátlan, piros alma védelem nélkül nem termesztendő, Az almafa varrasodás és a lisztharmat betegségtől, a gyümölcs és lombzat súlyosan károsodhat, ami komoly termés mennyiségi és minőségi veszteséghez vezet. Almásokban jelenleg az érzékeny fajtákon (Glaster) helyenként erős lisztharmatfertőzés tapasztalható. A fertőzött levelek alakja megváltozik, mereven felállóak, kanalasodnak, a fehéres bevonat alatt a levelek elhalnak, elszáradnak.

Száraz, meleg, csapadékmentes időjárásnak köszönhető, hogy az alma legsúlyosabb betegsége a körzetben, a kertekben csak észlelési szinten található, ha csapadékosra fordulna az időjárás, akkor számolnunk kell a megjelenésével. Termés károsítás esetén a gyümölcsök féloldalassá, deformálttá válnak és berepedeznek. Megelőző védelem mindenképpen javasolt.

Ajánlott készítmények:

Bravo 500 II. kategória

Dithane M-45 II-III. kategória

Score 250 EC III. kategória

Topas 100 EC III. kategória

Topsin M-70 WDG II. kategória

Almás kertekben folyamatos az almamoly rajzása, helyenként már kár is megfigyelhető. Az almamoly I. nemzedékének lárvái (hernyói) eleinte az alma felszínén hámozgatnak, majd berágnak a gyümölcsbe a magházig, a károsított almák lehullanak.

Tömegesen rajzik a lombos fa fehérmoly is. A hernyó a levélben egyre nagyobbodó kör alakú aknákat készít, a hernyó az aknában él. Tömeges elszaporodás esetén a hernyók a lombfelület nagy részét elpusztítják. A levéltetvek szaporodása folyamatos, különösen a levélpirosító levéltetű fertőzés igen erős.

Ajánlott készítmények:

Actara SC II. kategória

Karate 2,5 WG III. kategória

Calypso 480 SC II. kategória

Mospilan 20 SP III. kategória

Sumi Alfa 5 EC II. kategória

Steward 30 DF II. kategória

Késő érésű cseresznyében, meggyben intenzíven rajzik és károsít a cseresznyelég. Az európai cseresznyelég mellett megjelent az amerikai, keleti cseresznyelég, amelynek rajzása június közepétől szeptember második dekádáig is eltarthat. Jellemző, hogy egy gyümölcsben több „nyű” is található. Meggyben 40-50%-os kártétel is előfordulhat.

Ajánlott készítmények:

Actara SC II. kategória

Calypso 480 SC II. kategória

Decis III. kategória

Karate 2,5 WG III. kategória

Mospilan 20 SP III. kategória

Őszibarack ültetvényekben a csúcshajtásokon, leveleken megjelent sztigmás levélyukacsosodás gomba. Leveleken megjelennek a piros foltok, a foltok közepén a levél szövete elhal, kihullik, és megjelennek a lukak. A gomba farészt is erősen károsítja. A fertőzött levelek lehullanak. Őszibarackban megjelent a lisztharmat is.

Ajánlott készítmények:

Dithane M-45 II-III kategória
Folicur Solo II. kategória
Score 250 EC III. kategória
Teldor 500 SC III. kategória
Topas 100 EC III. kategória

Házi kertekben a szilva és a ringlófákon megjelentek a leggyakoribb állati kártevők a levéltetvek. Legveszélyesebb közülük a hamvas szilva-levéltetű. Szívogatása nyomán a hajtások satnyulnak, a levelek görbülnek, nő a tápanyagveszteség, a termés mennyisége, minősége romlik. Kontakt szerek hatástalanok, ebben a stádiumban már csak felszívódó hatású készítményekkel védekezhetünk eredményesen.

Ajánlott készítmények:

Actara WG II. kategória
Calypso 480 S II. kategória
Mospilan 20 SP III. kategória
Vertimec Pro II kategória

Szőlőben már a bogyókon is megjelent a lisztharmat (június 2-án). A lisztharmat jellegzetes tünetei, a szürkésfehér lisztes bevonat a bogyókon és levelek szélén. Erős fertőzés esetén felreped a bogyó és magok kifordulnak, mely kapu a botritiszes zöldrothadásnak. A lisztharmat száraz meleg időjárásban szaporodik fel.

Ajánlott készítmények:

Bumper 25 EC III. kategória
Cambrio Top II-III kategória
Falcon 460 EC II. kategória
Karathane Star II-III kategória
Thiovit Jet III. kategória
Topas 100 EC III. kategória
Topsin Metil 70 WDG II. kategória

Szőlőperonoszpóra hozzávetőlegesen 5-6 évente, termesztési körzetenként járványszerűen tizedeli meg a termést, akár már a virágzás időszakában. A járványos évekre jellemző, hogy a fürtök már virágzás idején súlyosan megbetegszenek. Jelenleg ebben az időszakban mérsékelt kései megbetegedésre lehet számítani. A peronoszpóra elleni védekezés legfontosabb időszaka általában júniusra esik, vagyis fürtkezdemények megnyúlásától a kötődés befejezéséig tart, majd a második fertőzési ciklus a kacshajtások fiatal levelein jelentkezik.

Ajánlott készítmények:

Cuproxat FW III. kategória
Cuprofix 30 DG III. kategória
Champion WG III. kategória
Cabrio Top II-III. kategória
Cymbal 45 WG II. kategória
Dithane M-45 II-III kategória

Forum R III. kategória
Montaflow SC III. kategória
Ridomil Gold 42,5 WP III. kategória
Tanos 50 DF II. kategória

Előrejelzési adatok alapján országosan gyenge a tarka szőlőmoly első nemzedékének rajzása, csak észlelési szinten található károsított fürtkezdemény. A második és a harmadik nemzedék hernyói a zöld és az érőfélben levő bogyókat károsítja. A védelmezés időpontjának megállapításához a csapdás rajzásmegfigyelések nyújtanak segítséget.

Ajánlott készítmények:

Bulldock 25 EC II. kategória
Coragen 20 SC II. kategória
Cyperkill 25 EC III. kategória
Decis Mega II. kategória
Karate 2,5 WG III. kategória
Sumi Alfa 5 C II. kategória
Steward 30 DF II. kategória

Szántóföldi burgonya táblákon szórványosan már megjelent a burgonyavész tünetei. Eleinte a levélcsőcs, levélszél, később a teljes lombszáradás formájában jelenik meg. A kedvező hőmérséklet mellett a csapadék, az öntözővíz, a hajnali harmat teszi lehetővé a gomba csírázását és a fertőzés terjedését. Ha a lombozatot előírászerű töménységben szerves vagy réz hatóanyagú permetszerrel már korábban beborítottuk, a gomba nem tud fertőzni, így elpusztul. A réz tartalmú szerek használata előnyösebb, mert a hatóanyag az erős nap ellenére nem bomlik fel.

Ajánlott készítmények:

Amistar III. kategória
Bravo 500 II. kategória
Cuprofix 30DG III. kategória
Cymbal 45 WG II. kategória
Forum R III. kategória
Infinito II-III. kategória
Montaflow III. kategória
Ranman Top III. kategória
Ridomil Gold MZ II-III. kategória
Tanos 50 DF II. kategória

Célzott védelem a burgonyabogár ellen. Igen korán már április környékén megjelentek a bogarak. A bogarak és a fejlődő lárvák a burgonya levelét fogyasztják, képesek a burgonya bokrokat torra rágni. Egy nemzedék nagyjából 6 hét alatt teljesen kifejlődik. Két-három hét múlva már megjelenik a második nemzedék. Védekezést akkor kell megkezdeni, amikor a növények 20%-án bogár, vagy 5-10%-os rágásnyom van. Fejlett állományokban tövenként 3-5 bogár vagy fejlett lárva, vagy 10-15 fiatal lárva esetén kell megkezdeni a védekezést.

Ajánlott készítmények:

Actara SC II. kategória
Apacs 50 WG II. kategória
Bulldock 25 EC II. kategória
Calypso 480 SC II. kategória
Coragen 20 SC II. kategória
Mospilan 20 SP III. kategória

Warrant 200 SL

A cikkben szereplő termékek megvásárolhatók a Délgazda Mezőgazdasági Szaküzletben!

Sikeres termelést kívánnak a gazdabolt munkatársai.

6760 Kistelek, Kossuth u. 88 (bejárat a Hársfa u. felől az udvarban)